

2 VARIZES ECTÓPICAS EM ANASTOMOSE PANCREATO-JEJUNAL: UMA CAUSA RARA DE HEMORRAGIA

Gonçalves BM, Bastos P, Leão P, Rolanda C, Gonçalves R

A hemorragia por varizes ectópicas é uma causa rara de hemorragia digestiva, representando menos de 5% de todas as hemorragias por varizes. A causa mais comum de varizes ectópicas é a presença de hipertensão portal. Na sua ausência outras causas têm de ser consideradas, nomeadamente antecedentes de cirurgia abdominal. A hemorragia por varizes ectópicas apresenta-se um desafio diagnóstico uma vez que os métodos auxiliares de diagnóstico iniciais frequentemente são normais, sendo a endoscopia digestiva fundamental no seu diagnóstico e tratamento.

O autores apresentam o caso de um doente de 56 anos que recorreu ao serviço de urgência por apresentar melenas com uma semana de evolução. Os antecedentes médicos do doente incluíam um adenocarcinoma pancreático tratado há dois anos com duodenopancreatectomia com preservação do piloro e quimioterapia. Na admissão os sinais vitais estavam estáveis mas as análises laboratoriais revelaram anemia grave (hemoglobina de 6,4g/dl). Após endoscopia digestiva alta, ileocoloscopia e angio-TC normais, foi decidida a realização de push enteroscopy pelas ansas jejunais. Ao longo da ansa aferente foi notada a presença de sangue fresco tendo-se alcançado a anastomose pancreato-jejunal. Em localização peri-anastomótica foram visualizadas formações vasculares nodulares e azuladas sugestivas de varizes ectópicas. Foi identificado um ponto de rutura tendo sido tratado com injeção endoscópica de cianoacrilato e lipiodol. A radiografia abdominal de controlo revelou a localização e oclusão das varizes. No seguimento após o procedimento o doente não apresentou recidiva hemorrágica, tendo repetido a push enteroscopy duas semanas depois, que revelou varizes ocluídas não tendo sido necessárias mais intervenções.

Para conhecimento dos autores, este caso apresenta a primeira documentação iconográfica de varizes ectópicas peri-anastomose pancreato-jejunal. Mais do que o sucesso clínico com uma terapêutica endoscópica convencional, realçamos as raras imagens endoscópicas desta situação incomum.

Serviço de Gastrenterologia do Hospital de Braga