

100 HEMOSUCCUS PANCREATICUS: CAUSA RARA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Sousa P , Rodrigues J , Pinho J , Martins D , Araújo R , Cancela E , Castanheira A , Ministro P ,
Gonçalves B , Daniel C , Silva A

Doente de 76 anos com antecedentes de fibrilação auricular, motivo pelo qual tinha iniciado recentemente rivaroxaban, recorreu ao serviço de urgência por astenia e melenas. Analiticamente apresentava anemia aguda com 5,4g/dL de hemoglobina. Após medidas de estabilização foi realizada endoscopia digestiva alta, constatando-se hemorragia em babamento com origem na segunda porção duodenal. Realizada endoscopia com aparelho de visão lateral, conseguindo-se identificar a papila menor como fonte de hemorragia e drenagem biliar não hemática pela papila major. Realizou exames imagiológicos seccionais, sem evidência de alterações pancreáticas. A angiografia demonstrou aneurisma subcentimétrico na porção intrapancreática da artéria gastroduodenal. Procedeu-se a embolização da gastroduodenal, aneurisma e ramos pancreáticos acessórios. Apesar do procedimento, a doente manteve hemorragia ativa evidenciada em revisões endoscópicas e pela constante necessidade de terapêutica transfusional. Na angiografia de revisão constatou-se que o aneurisma estava ocluído, não se identificando a origem da hemorragia persistente. Realizou-se duodenopancreatectomia cefálica. A peça operatória não evidenciou lesão orgânica evidenciável à qual pudesse ser atribuída a etiologia do *hemosuccus pancreaticus*. O *hemosuccus pancreaticus* é uma causa rara de hemorragia digestiva, sendo mais comumente causado por uma rotura de aneurisma associado a pancreatite aguda ou crónica. O diagnóstico é geralmente difícil, devido ao carácter intermitente da hemorragia.

Apresenta-se este caso pela sua raridade e pelas circunstâncias que o tornam singular. Em primeiro lugar, trata-se de um caso de *hemosuccus pancreaticus* numa doente sem qualquer estigma de pancreatite. Em segundo lugar, apesar do achado do aneurisma na artéria gastroduodenal, não seria esta a causa da hemorragia, como evidenciado pela ineficácia da embolização, não se tendo no entanto identificado uma causa evidente na peça operatória. Por último, discute-se a relação da hemorragia com a introdução do rivaroxaban. Destaca-se ainda a iconografia recolhida.

Centro Hospitalar Tondela-Viseu